

# Calendário de vacinação Ocupacional

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm) – 2018



| Vacinas especialmente indicadas   | Esquemas e recomendações   | Indicações especiais para profissionais por área de atuação |                     |                                  |   |          |         |                       |                               |                                |                            |  |   |   |                       |
|---|--|---|---------------------|----------------------------------|---|----------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------------------|
|   |  | Saúde   | Alimentos e bebidas | Militares, policiais e bombeiros | Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo | Crianças | Animais | Profissionais do sexo | Profissionais administrativos | Profissionais que viajam muito | Receptivos de estrangeiros | Manicures, pedicures, podólogos e tatuadores | Profissionais que trabalham em regime de confinamento | Profissionais de Serviços de Ajuda Humanitária. | Atletas profissionais |
| <b>Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)</b>  | É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido duas doses acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas.  | SIM   | —                   | SIM                              | —   | SIM      | —       | SIM                   | —                             | SIM                            | SIM                        | —  | SIM   | SIM   | SIM                   |
| <b>Hepatites A, B ou A e B</b>  | <b>Hepatite A:</b> duas doses, no esquema 0 - 6 meses.   | SIM   | SIM                 | SIM                              | SIM   | SIM      | —       | SIM                   | —                             | SIM                            | SIM                        | —  | SIM   | SIM   | SIM                   |
|   | <b>Hepatite B:</b> três doses, esquema 0 - 1 - 6 meses.  | SIM   | —                   | SIM                              | SIM   | —        | —       | SIM                   | —                             | SIM                            | —                          | —  | SIM   | SIM   | SIM                   |
|   | <b>Hepatite a e B:</b> três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.   | SIM   | —                   | SIM                              | SIM   | —        | —       | SIM                   | —                             | SIM                            | —                          | SIM  | SIM   | SIM   | SIM                   |
| <b>HPV</b>  | Dois vacinas estão disponíveis no Brasil: HPV4, licenciada para ambos os sexos e HPV2, licenciada apenas para o sexo feminino.   | —   | —                   | —                                | —   | —        | —       | SIM                   | —                             | —                              | —                          | —  | —   | —   | —                     |
| <b>Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP</b><br><b>Dupla adulto (difteria e tétano) – dT</b> | Aplicar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT.<br><b>Com esquema de vacinação básico completo:</b> reforço com dTpa dez anos após a última dose.<br><b>Com esquema de vacinação básico incompleto:</b> uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.<br>A dTpa pode ser substituída por dTpa-VIP ou dT, dependendo da disponibilidade. | dTpa (6)  | dT                  | dT ou dTpa-VIP (10)              | dT  | dTpa (7) | dT      | —                     | —                             | dTpa-VIP (8)                   | —                          | dT   | dTpa (7)  | dTpa-VIP  | dT ou dTpa-VIP (8)    |
| <b>Poliomielite inativada</b>   | <b>Pessoas nunca vacinadas:</b> uma dose. Na rede privada só existe combinada a dTpa.  | —   | —                   | SIM                              | —   | —        | —       | —                     | —                             | SIM                            | —                          | —  | —   | SIM   | —                     |
| <b>Varicela (catapora)</b>  | <b>Para suscetíveis:</b> duas doses com intervalo de um a dois meses.  | SIM   | —                   | SIM                              | —   | SIM      | —       | SIM                   | —                             | SIM                            | SIM                        | —  | SIM   | SIM   | SIM                   |
| <b>Influenza (gripe)</b>  | Dose única anual. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, inclusive em gestantes, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.  | SIM   | SIM                 | SIM                              | SIM   | SIM      | SIM     | SIM                   | SIM                           | SIM                            | SIM                        | SIM  | SIM   | SIM   | SIM                   |
| <b>Meningocócicas conjugadas (C ou ACWY)</b>  | Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.  | SIM   | —                   | SIM                              | —   | —        | —       | —                     | —                             | SIM                            | —                          | —  | —   | SIM   | SIM                   |
| <b>Meningocócica B</b>  | Dois doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica.   | SIM   | —                   | SIM                              | —   | —        | —       | —                     | —                             | SIM                            | —                          | —  | —   | SIM   | SIM                   |
| <b>Febre amarela (1, 2)</b>   | Uma dose para residentes ou viajantes para áreas de vacinação (de acordo com classificação do Ministério da Saúde). Pode ser recomendada também para atender a exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais. Em ambos os casos, vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.   | —   | —                   | SIM                              | —   | —        | —       | —                     | —                             | SIM                            | —                          | —  | —   | SIM   | SIM                   |
| <b>Raiva</b>  | <b>Para pré-exposição:</b> três doses, 0 - 7 - 21 a 28 dias.   | —   | —                   | SIM                              | —   | —        | SIM     | —                     | —                             | —                              | —                          | —  | —   | SIM   | SIM                   |
| <b>Febre tifoide</b>  | Dose única. No caso de o risco de infecção permanecer ou retornar, está indicada outra dose após três anos.  | —   | —                   | SIM                              | SIM   | —        | —       | —                     | —                             | SIM                            | —                          | —  | —   | SIM   | SIM                   |